

constamment donné des fleurs à six ou à sept pétales. Cependant, nous en avons remarqué, l'an passé, deux à cinq pétales. Ce Rosier a été propagé, en 1807, par M. AUVÉ-CHARPENTIER, chirurgien à Sablé, près la Flèche. Vulg. *Rosier Pompon à fleurs simples*.

β. *R. Pomponia Burgundica*. (N.)

*R. Pomponia*. DC. *RED. Roses*, p. et fig. 65. *An Rosa nana?* Nouv. DUMAM. vol. 7. p. 38, n° 38. Vulg. *Le Rosier de Bourgogne*; le *Pompon à fleurs doubles*.

γ. *R. Pomponia bicolor*. (N.) Pétales de la circonférence presque blancs, ceux du centre d'un beau rose : très-petite fleur. On ne doit pas confondre ce Rosier avec celui que les pépiniéristes ont répandu, depuis quelques années, dans le commerce, sous le nom de *Pompon blanc*, lequel n'est qu'un hybride du *R. Alba* et du *Gallia*, dont il participe évidemment. La fleur de celui-ci, d'ailleurs, beaucoup plus grande que celle du *Pompon ordinaire*, présente une particularité remarquable dans sa floraison : d'abord d'un rose-tendre, elle devient blanche en peu de temps; ses pétales alors se renversent en-dehors et offrent une Rose arrondie comme la fleur du *Viburnum opulus* (la boule de neige), circonstance d'après laquelle nous l'avons nommée *Rosa Viburnum*. C'est un Rosier à examiner, et dont nous n'avons pu, jusqu'à-présent, assigner la place.

À l'égard du *Rosier Pompon blanc*, de M. NOÏSETTE, dont nous avons parlé ailleurs, nous ne l'avons pas encore vu en fleurs.

δ. *R. Pomponia variegata*. (N.) Variété à fleurs panachées que nous avons observée dans quelques jardins. Vulg. *Rosier Pompon panaché*.

ε. *R. Pomponia foliacea, germinibus subglabris, laciniis calycinis foliaceis*. (N.) Sous-arbrisseau un peu plus élevé que les précédents, remarquable par la grande quantité de fleurs dont il se couvre, et les divisions foliacées du calice. Les tubes sont presque toujours nuls. C'est le *Pompon mignon*, ou la *Mignonne charmante* des pépinières.

ζ. *R. Pomponia Remensis, germinibus subrotundis pedunculisque subulapidis, laciniis calycinis brevissimis appendiculatis, appendicibus linearis-setaceis*. (N.)

*R. (Remensis)*. DESE. Cat. 175. DC. Fl. fr. 3708.

*R. (Burgundica)*. ROESS. *Roses*, Tab. 4.

*R. (Burgundica var. Provincialis)*. Pers. syn. 2, p. 27.

Petites fleurs, d'un beau pourpre et très-nombreuses. Vulg. *Le Pompon de Rheims*; le *Rosier de Rheims*; le *Petit-Saint-François*. On connaît, de ce sous-arbrisseau, des sous-variétés plus ou moins élevées, avec des fleurs plus ou moins grandes.

Indépendamment des noms vulgaires que l'on donne à ces Rosiers, et que nous avons énumérés, on les appelle encore, sans distinction, dans les pépinières, *Pompon pygnée*; *Pompon rouge*; *Pompon des Alpes*; *Pompon de Dijon*; *Rosier de Meaux* (*Rosa mieldensis*) Bot. cult. etc.

Les variété β, γ et ε, sont très-communes; les autres, sur-tout la variété α, sont peu répandues.

Voir ce que nous avons dit de la culture du *Rosier Pompon*, vol. 1, p. 66.